

1. Eerste vreemde soorte van Hesperis heeft bladeren die dan de Damagbloemen gelijk maect wat breeder ende dicker...

2. Tweede vreemde Hesperis, oft Hesperis van Surien, waer aenden reucant van Surien, en is aen Clusius wt Italien gesonden...

3. Dede vreemde Hesperis waer in't wilt bij Wien in Oostenryck: ende bloeyt in Meymaent ende Iyomaent...

Crachte. Werckinge van Damagbloemen. Men houdt alle de soorten van Damagbloemen seer goet tegen den hoest...

Sommige houden dat dit cruyt Viola maritima genaemt is als byouwen cruyt om dattet de moeder seer goet is...

In de gebreken van de hoest ghebruycken sij het water daer de bloeme van dit cruyt in gesoden sijn: maer inde qualen van de moeder...

Men houdt dat den reuck van dese bloemen seer goet is om de swaer moedige en doofachtige menschen te verheuen...

HET VI. CAPITTEL. Van Penninck-bloemen/ oft Paelsch-bloemen.

Onder de Violieren oft Violetten worden oock dese twee soorten van Violetten met breede bladeren gerekent: te weten de gemeene Penninckbloemen...

Gedaente. 1. Penninckbloemen hebbe groene breede hendre ranten gehertelde bladeren die van de Allaria, oft Looch sonder Looch ghelijck maect groeter dan die...

Penninckbloemen, oft Solbonac.



2. De tweede soorte van Breebladighe Violetten oft Penninck bloemen is de gemeene aengaende heur breede bladeren ende heur platte oft effene en ronde haeruwkens...

1. De Gemeene Penninckbloemen worden hier te lande in de hoven ghesaepet en onderhouden.

2. De tweede soorte van Penninckbloemen rouwt voort in sommighe vosschen van Bohemerlant: naest Hoofse Wuysselant liggende.

3. Naem. Dese bloemen worden bij den gemeenen man ende sommighe Apothekers Bulbonac oft Solbonac met eenen Barbarischen naem gheheten.

4. Gedachte. 1. Penninckbloemen hebbe groene breede hendre ranten gehertelde bladeren die van de Allaria, oft Looch sonder Looch ghelijck maect groeter dan die...

2. Maer soe wel de tweede als de eerste soorte mach den naem van Penninckbloemen voeren: dan men soude de eerste mogen Groore Penninckbloemen en de ander Cleyne Penninckbloemen seeten.

Tblaspi

Thlaspi van Crataeus. Doort soe sijn dit dese onse Oesterne Penninckbloeme de selve te weten die bij de onden Thlaspi alcerum gheheten: en van Crataeus beschreuen is...

4. Aert. Cracht ende Werckinge. Het saet van Penninckbloemen is van aert en crachten weem ende droochscheyt in den mont: van cracht ende smaect den sade van Thlaspi ghelijck: De Wortelen hebben oock wat scherpe herts in heur: maer niet veel: sij worden met Coich ende Saut gegeten: als de wortelen van sommighe andere cruyden...

BIIVORSESEL.

Vesel Alchemisten en ander ondersoekers der bezolen conseruen hebben dit cruyt seer gesocht ende ghebruyct: verhoepende daer mede enige wonder wercken tot te rechen ghelijck sij meest plegen met alle de andere soorten van cruyden die den naem Lunaria oft Maerkruyt voeren: want sommighe dan dien ghebruycken het saet van dit cruyt met die belckens van de platte penninckbloem haeruwkens stielich is: sommighe ghebruycken alleen het middelste velcken: welck silberbeuich is: ende eer het sijn gheheten: dat sijn deel van een cruyt sijn te weten: want sij gelouden dat die seer bequaem sijn om heur segels van sijn ende ander holdende...

Penninck-bloemen iaerlijcx weder wuyruyende. Dit cruyt is van Lobel beschreuen onse tweede soorte niet seer onghelijck doech in de winter groen blyuende: hebbende harder stelen blecker bloemen maer de bladeren seer ghelijck de andere: alleen wat ronder en rouw. De wortel spuyt iaerlijcx weder tot die geynsus hollachtich en is oft immers seer luttel. Sij noemte in Latin Lunaria Raphanus, oft Solbonac radice radium.

Naem. Aengaende de naemen van dit cruyt: soe is dat van sommighe Lunaria odorata gheheten: ende soe Lobel secht is r' onrecht van Fuchsius gehonden door Raphanus siluestris, ende Amoraia. Den seluen Lobel meent dattet Solbonac heet nae sijn dicke groote woortelen: die eethaer sijn: dert wige spuyt ende hollachtich: euenichs die van de Hoffbille oft Bloeme ghelijck maer niet soe dick.

Crachte ende Werckinge. Dit cruyt mach ghebruyct worden als de eerste ende Thlaspi: het verweert de maentstonden daer a d' d' waert: en doet pissen: als hiet en scherp van smaect: sonderlinge t' saet: mochtans worden de wortelen door s' maet gegeten: als doofseer is ghelijck de Kapuukelen: de welke soe hiet niet en sijn als men segt dat de wortelen van het Thlaspi van Crataeus sijn.

HET VII. CAPITTEL.

Dan Viola Dentaria, oft Cozael-Violiere.

Geslachten.

1. Over t'getal van de Violieren sijn ooc wel te behooren de gene die in Latin Dentaria genaemt worden: ende sijn tweederley.

Gedaente. 1. De eerste cruyt een Steelen ontrent een spanne hooch op schietende: de bladeren sijn ghelijck die van Kienry oft Wijnvinger cruyt: sij aen een steelen hangende: lancetwoylich: breedt: ende rontom ghekerst: Die bloemen sijn den Violieren van gedaente ghelijck: van heurde huypperech: oft wt den rooden purpurachtich: die haeruwkens oft Saetjupkens sijn oock den haeruwkens van Violieren ghelijck: daer het saet in ligt. De wortel is lancetwoylich: onghelijck: rouw: ende van veel crabbelen oft scubben aen een gemaect.

2. De andere soorte cruyt ghelijck bladeren die gheert-sins die van Wijnvinger cruyt ghelijck: maer veel eer ghelijck de Eschenbladeren gheboegt staen: hebbende int midden een ribben: daer aen de bladeren van depe sijden vast sijn. Dese bladeren sijn lancetwoylich: ende hiet: ende rontom de kanten ghekerst: ende doofsedendichtich: seuen aen een ribben oft middelsteelken staende. De bloemen sijn wit: ende de haeruwkens die daer nae volghen: sijn die van de boogaende soorte.

Eerste soorte van Dentaria, oft Cozael-Violiere.



Tweede soorte van Dentaria, oft Cozael-Violiere.



崑崙草種類

gde